

et fasciés de jaune; pattes en partie noires, en partie testacées. Tête à peine plus large que le prothorax, tronquée en arrière; yeux gros, assez rapprochés entre eux et touchant le bord postérieur de la tête; prothorax presque carré, à angles antérieurs arrondis, à faible impression basale, densément ponctuée; écusson grand, pubescent de gris; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, en ovale allongé, courttement rétrécis en arrière, subruguleusement ponctués, faiblement impressionnés près de la base, chacun de ces organes orné des dessins jaunes suivants : une macule humérale, une fascie antérieure sinuée, échancrée en avant et longuement prolongée en arrière sur le disque, une fascie postmédiane arquée, la pointe dirigée en bas du côté de la suture; pattes grêles, postérieures comprises. Long. 2-3 millimètres.

Île Bourbon.

Cette espèce des plus distinctes par ses dessins élytraux peut se placer, ainsi que la précédente, dans le voisinage de *H. macularis* Pic.

---

DEUX NOUVEAUX PTINIDE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR MAURICE PIC, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les deux espèces nouvelles décrites ici font partie de la très intéressante et précieuse Collection Fairmaire; elles sont représentées malheureusement chacune par un seul exemplaire. Le genre *Microptinus* n'était pas encore connu d'Asie; au point de vue géographique, c'est donc une découverte intéressante. Le *Ptinus* pourrait bien être le ♂ inconnu de *P. elegans* Sol. ♀, mais ce n'est pas certain; dans tous les cas, ce dernier, par sa coloration différente, ne peut pas être identifié complètement avec *P. elegans* et mérite au moins d'être regardé comme une variété de cette espèce.

***Microptinus longicornis* nov. sp.**

Brevis, apice attenuatus, nitidus, nigrometallicus, griseo aut luteo pilosus et hirsutus; antennis nigris, longissimis; pedibus satis gracilibus, rufescentibus. Asia meridionalis.

Court, atténué en arrière, brillant, orné d'une pubescence grise ou jaunâtre plus ou moins redressée et assez longue, noir métallique (extrémité des élytres et partie de l'abdomen vaguement roussâtres), avec les pattes roussâtres. Tête moyenne, un peu inclinée, avec les yeux, ceux-ci assez saillants, aussi large que le prothorax, densément et ruguleusement ponctuée; antennes noires, filiformes, très longues, un peu plus longues

que le corps, à articles tous allongés, les derniers surtout, terminal à peine plus long que le précédent; prothorax bien plus étroit que les élytres, un peu plus long que large, étranglé près de la base puis élargi ensuite, subglobuleux en avant, orné d'une ponctuation forte et peu écartée sur cette partie, presque lisse sur la base: écusson petit mais visible; élytres peu plus longs que larges, un peu élargis vers le milieu, fortement rétrécis en arrière, à épaules nulles, faiblement strié-ponctués avec les interstries assez larges; pattes assez grêles, roussâtres. Long., à peine 2 millimètres. Singapore.

Cette nouveauté se reconnaît à première vue dans tout le genre par ses longues antennes, en même temps que par la forme des élytres qui est courte et très atténuée postérieurement; peut se placer près de l'*M. nobilis* Reitt.

**Ptinus posticatus** nov. sp.

♂. Elongatus, subparalellus, nitidus, griseo-pubescens, rufo-testaceus. capite brunnescente, elytris ad apicem brunnescentibus, his albo-fasciatis; antennis pedibusque rufo-testaceis, gracilibus. America meridionalis.

Allongé, subparallèle, brillant, pubescent de gris, roux-testacé, membres compris (ceux-ci grêles) avec la tête un peu rembrunie et les élytres brunâtres au sommet, ceux-ci fasciés de blanc. Tête avec les yeux qui sont gris, large, plus large que le prothorax; antennes longues et grêles, à 2° article bien plus court que le 3°, dernier peu plus long que le précédent; prothorax étroit, plus long que large, sinué latéralement, un peu étranglé près de la base et sillonné transversalement sur cette partie avec une fovéole médiane faible. partie basale un peu relevée en bourrelet, orné de quelques points forts épars sur la portion antérieure qui est à peine élargie; écusson grand et large; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, courtement rétrécis au sommet, à stries faibles ponctuées de points larges. interstries très étroits, ces organes, d'un roux-testacé, sont brunâtres sur leur tiers apical et ornés, avant et après le milieu, de courtes et peu distinctes fascies faites de poils squamuleux blancs: dessous du corps roux-testacé; pattes grêles. Long., 4 millimètres environ. Chili, Cordillère de Santiago, en janvier (Fernando Paulsen).

Cette espèce est très différente de toutes les espèces connues de l'Amérique méridionale, soit par sa forme, soit par sa coloration, et devra prendre place près de l'*P. elegans* Sol.

CATALOGUE DES ASCALAPHIDES DES COLLECTIONS DU MUSÉUM

PAR M. H. VAN DER WEELE.

Ce catalogue est dressé d'après la détermination de M. H. van der Weele, qui a bien voulu étudier les Ascalaphides du Muséum. La systématique est celle adoptée récemment par M. Van der Weele dans son importante monographie, publiée à Bruxelles par les soins de Messieurs les fils du Baron E. de Selys-Longchamps.

SOUS-FAMILLE : **Holophthalminae.**

**Bias** Rambur.

B. ALBISTIGMA Walker. — Honduras, San Pedro Soula (H. van der Weele, 1907).

B. MICROCERUS Rambur. — Antille (Maugé, *Type!*).

**Amoea** Lefebvre.

A. CHLOROPS Blanchard. — Brésil, Montagnes des Orgues, environs de la Tijuca, 500-900 mètres d'altitude (E. R. Wagner, 1902).

**Episperches** Gerstaecker.

E. VAGUS Gerstaecker. — Honduras (van der Weele, 1907).

**Haploglenius** Burmeister.

H. COSTATUS Burm. — Brésil, montagnes des Orgues, environs de la Tijuca. 500-900 mètres d'altitude (E. R. Wagner 1902); Minas Geraes, environs de Passa quatro, 1,000 mètres d'altitude (E. R. Wagner, 1903); Theresopolis (van der Weele, 1907).

H. FLAVICORNIS Mac Lachlan. — Mexique (Sallé, 1856).

H. LUTEUS Walker. — Pérou (van der Weele, 1907).

**Protidricerus** van der Weele.

P. EXILIS Mac L. — Chine, Mou-pin (A. David, 1870).

P. JAPONICUS Mac L. — Nippon moyen, environ de Tokyo (J. Harmand, 1906).

**Idricerus** Mac Lachlan.

I. SOGDIANUS Mac L. — Turkestan, Kohistan (Capus et Bonvalot, 1882).

**Allocormodes** Mac Lachlan.

A. INTRACTABILIS Walker. — Ogooué, Lambaréné (E. Haug, 1896).

A. LEFEBVREI van der Weele. — Congo (Lecomte, 1894, *Type!*); Ogooué, N'gomo (Ellenberger, 1906).

A. MACULIPENNIS Taschenberg. — Fernando-Po (L. Conradt, 1901).

**Campylophlebia** Mac Lachlan.

C. MAGNIFICA Mac L. — Congo, Ogooué, N'gomo (E. Haug, 1906).